

Verbraucherinformation

KaRazym® magensaftresistente Tabletten

Nahrungsergänzungsmittel mit Papain, Bromelain, Pankreatin und Rutin

Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Enzyme sind Eiweißverbindungen, die an vielen Stoffwechselfvorgängen im Körper beteiligt sind (Biokatalysatoren).

Bei den in **KaRazym®** enthaltenen Enzymen handelt es sich um eiweißspaltende Enzyme (Proteasen) aus Pflanzen (Papayas, Ananas) und Tieren (Schweinen).

In der Herstellung von **KaRazym®** werden Enzyme mit hoher Aktivität verwendet, die Aktivität pro Tablette ist für die Bewertung der Qualität ausschlaggebend.

Proteolytische Gesamtaktivität: mind. 1.800 FIP pro Tablette

Inhaltsstoffe, bezogen auf die Tagesdosis:

Tagesdosis 4 Tabletten		Tagesdosis 6 Tabletten	
Papain	480 mg	Papain	720 mg
Bromelain	360 mg	Bromelain	540 mg
Pankreatin*)	200 mg	Pankreatin*)	300 mg
Rutin	200 mg	Rutin	300 mg

*) enthält Trypsin, Chymotrypsin, Lipase und Amylase

Zutaten: Papain, Bromelain, Pankreatin, Rutin, Inulin, Trennmittel: mikrokristalline Cellulose, Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Füllstoff: vernetzte Carboxymethylcellulose; Verdickungsmittel: Hydroxypropylcellulose und Hydroxypropylmethylcellulose; gereinigtes Wasser, Überzugsmittel: Talkum; Säureregulator: Natriumhydroxid; Aroma (Vanille)

Laktosefrei, glutenfrei, zuckerfrei, farbstofffrei

Empfohlene Tagesdosis:

Die ersten drei Tage: 2 x 3 Tabletten (6 Tabletten) pro Tag,
in weiterer Folge: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag

Die Tabletten am besten 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. **KaRazym**[®] Tabletten sind mit einem magensaftresistenten Überzug versehen, um die Enzyme und deren Aktivität vor dem Angriff der Magensäure zu schützen. Die Tabletten werden im Dünndarm aufgelöst und die Enzyme freigesetzt. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Bei Einnahme von **KaRazym**[®] gemeinsam mit blutverdünnenden Mitteln (z.B. Marcoumar[®]) kann es zu einem erhöhten Blutungsrisiko kommen. **KaRazym**[®] darf daher nicht verwendet werden, wenn Medikamente zur Blutverdünnung angewendet werden oder wenn Störungen der Blutgerinnung vorliegen. Auch bei Unverträglichkeiten gegen Inhaltsstoffe der Papaya, Ananas oder Kiwi sollte **KaRazym**[®] nicht eingenommen werden.

Das **Mindesthaltbarkeitsdatum** auf der Außenverpackung und am Tablettenblister beachten. Nach Ablauf nicht mehr anwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken und bei Raumtemperatur lagern.

Verfügbare Packungsgrößen:

KaRazym[®] Tabletten zu: 100 Stk. (PZN D: 02512129 / PZN Ö: 3573363)
200 Stk. (PZN D: 02512141 / PZN Ö: 3573386)
400 Stk. (PZN D: 07360078 / PZN Ö: 3269197)

In Apotheken und online unter www.volopharm.com erhältlich.

Weitere Auskünfte zu KaRazym[®] Tabletten (magensaftresistent) erhalten Sie:

Tel. Nr. Deutschland: +49 (0) 8654 / 608 730

E-Mail: office@volopharm.com

Home: <http://www.volopharm.com/de>

Tel. Nr. Österreich: +43 (0) 732 / 23 73 74

E-Mail: office@volopharm.com

Home: <http://www.volopharm.com>

VOLOPHARM GmbH Deutschland

Münchener Straße 67

D-83395 Freilassing

Stand der Verbraucherinformation: Oktober 2024